

Über einige Eigenschaften der Gefäßmuskulatur mit besonderer Berücksichtigung der Adrenalinwirkung.

Inaugural-Dissertation

verfaßt und der

Hohen medizinischen Fakultät

der

Kgl. Bayer. Julius-Maximilians-Universität Würzburg

zur

Erlangung der Doktorwürde

vorgelegt von


Oskar Bertold Meyer

aus Würzburg.

München.

Druck von R. Oldenbourg.

1906.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41507204_0158

Über einige Eigenschaften der Gefäßmuskulatur mit besonderer Berücksichtigung der Adrenalinwirkung.

Inaugural-Dissertation

verfaßt und der

Hohen medizinischen Fakultät

der

Kgl. Bayer. Julius-Maximilians-Universität Würzburg

zur

Erlangung der Doktorwürde

vorgelegt von

Oskar Bertold Meyer

aus Würzburg.



München.

Druck von R. Oldenbourg.

1906.

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät der
Universität Würzburg.

Referent: Herr Prof. Dr. von Frey.

Über einige Eigenschaften der Gefäßmuskulatur mit besonderer Berücksichtigung der Adrenalinwirkung.

(Von der medizinischen Fakultät zu Würzburg preisgekrönte Arbeit.)

Übersicht des Inhalts:

Im Kurventext gebrauchte Abkürzungen; Zeitschreibung für die Kurven S. 4.
Einleitung. Versuch einer neuen Methode. Gewinnung des Präparates. Beseitigung des Verkürzungszustandes desselben. S. 4—6.

Physikalische Eigenschaften des Gefäßstreifens.

Eine Prüfung dieser ist gut ermöglicht, da spontane Zusammenziehungen fehlen. — Langsame Einstellung der Länge auf die Spannung. — Die zyklische Deformation ergibt, verglichen mit dem Skelettmuskel, einen größeren Arbeitsverlust. — Einfluß der Temperatur auf die Einstellung. S. 6—8.

Physiologisches Verhalten.

I. Reizung durch plötzliche Erwärmung. S. 8.

II. Elektrische Reizung. Spannung und Reizstärke. Reizschwelle. Latenzzeit. Temperatur. Alter des Präparates: a) Verhalten des in der Kälte aufbewahrten, b) des bei Körpertemperatur gehaltenen Präparates. S. 9—13.

III. Chemische Einwirkungen. Adrenalin. Adrenalinreizung bei niedriger und hoher Spannung. Unterschiede zwischen der elektrischen und Adrenalinreizung. Reizung tagelang in der Kälte bewahrter Präparate. Auch bei Körpertemperatur gehaltene Präparate sind mehrmals reizbar. S. 13—16. Wirksame Konzentrationen des Adrenalins. — Mit steigender Konzentration wächst die Verkürzungsgröße. — Gleichmäßigkeit der Resultate bei Adrenalinreizung. — Vergleich mit anderen, in sehr geringen Mengen wirksamen Stoffen. S. 16—19. — Auswaschbarkeit des Adrenalins. Zum Nachweis derselben zwei Versuchsanordnungen. S. 19—21. — Blutdruckerniedrigende Substanz. S. 22, 23 — Zerstörung des Adrenalins: Durch das Gewebe (Gefäßwand), die Zirkulation (Auswaschung) und den Sauerstoff. — Beteiligung eines dem Adrenalin konträr wirkenden Stoffes beim Abklingen der Adrenalinwirkung? — Alkaloidähnliche Wirkung des Adrenalins. S. 23—25. — Eine adrenalinähnliche Substanz im Blute. S. 26. — Verwandte Stoffe: Suprarenin, Soloid Hemisine, Suprarenaltaboids, Nebennierenpesssaft. — Versuche mit Ergotin, Helleborein, Stypticin. S. 26—29. — Adrenalinwirkung auf einige andere, den Gefäßstreifen analog präparierte Organe: Frostmagen, Aalmagen, Kaninchenblase, Kalbsuterus. Wirkung auf Venenstreifen, auf die Lungengefäße. — Versuche am lebenden Tier. S. 29—33.

Versuche mit anderen chemischen Substanzen: Wirkungen von Atropin, Curare, Cocain. — Leitungswasser; Kaliumchlorid, Bariumchlorid. S. 33—36.

Angriffspunkt des Adrenalins.

Kurzer geschichtlicher Überblick. — Antagonismus des Atropins (Curare, Cocain). — Angabe von Beweisen für die Nervenendwirkung des Adrenalins. S. 37–41.

Untersuchung und Besprechung einiger für die Methode interessierenden Fragen.

Verhalten der Präparate in Ringerlösung von verschiedenem Chlornatriumgehalt. S. 41. — Versuche über die Frage der Sauerstoffzufuhr. Im ganzen erweist sie sich als vorteilhaft. S. 41–44. — Bemerkung über die sog. »Totenstarre« der glatten Muskeln und über den »Tonus«. Beseitigung desselben durch Dehnung ist für diese Versuche am zweckmäßigsten. — Zusammenfassung der wichtigsten Resultate. S. 44–47. — Literatur. S. 48.

Im Kurventext gebrauchte Abkürzungen: *p. m.* = post mortem (Tötung des Tieres). *Z* = Zwillingspräparat (Parallelpräparat; vgl. Text S. 6). *Sp* = Spannung. *Ö* = Öffnungsschlag bei 0 mm Rollenabstand. *A* = Adrenalin. — Über die Zeitmaße (Zeitschreibung) der Kurven s. Fig. 5, S. 9, und Anmerkung daselbst.

Einleitung.

Angeregt durch die von der medizinischen Fakultät Würzburg für das Jahr 1904/05 gestellte Preisaufgabe, habe ich mich in letzterer Zeit mit Untersuchungen an glatten Muskelpräparaten, vorwiegend der Gefäßmuskulatur und speziell der Adrenalinwirkung befaßt. Durch eine von Herrn Professor v. Frey mir vorgeschlagene Methode konnte man hoffen, dem vielbearbeiteten Gebiete der Adrenalinfrage einige neue Seiten abzugewinnen. Auf die ausgedehnte Literatur über die Nebennieren und das Adrenalin einzugehen, darf ich mir wohl versagen, weil hierüber eine Anzahl umfassender Arbeiten erschienen sind.¹⁾

Nach einer Reihe von Vorversuchen gestaltete sich die in der großen Mehrzahl der Versuche geübte Methode folgendermaßen.

Als Präparate dienten aus Rindersubklavien bzw. -Karotiden ausgeschnittene Ringe. Bei der Nähe des Schlachthauses konnten die Gefäße, wenn nötig, lebenswarm zur Untersuchung gebracht werden. Die Ringe wurden aufgeschnitten und der also entstandene Gefäßstreifen an beiden Enden ligiert. Das eine Ende wurde an einem Platinhaken befestigt. Dieser durchbohrte einen Kautschukpfropfen, der den Boden des gläsernen Versuchszylinders bildete. Das obere Ende des Präparates wurde durch einen Faden mit einem zweiarmigen Hebel verbunden.

1) Ich nenne: Goldschmitt, Materialien zu einer Monographie über Nebennieren, Inaug.-Diss., Halle 1904; Boruttau in Nagels Handbuch der Physiol. des Menschen, Bd. 2, 1. Hälfte, S. 18–36; Möller, Kritisch-experimentelle Beiträge zur Wirkung des Nebennierenextraktes (Adrenalin), Therapeut. Monatshefte 1905, 11 u. 12; 1906, 1 u. 2.

Wo nicht anders bemerkt, schrieb dieser mit sechsfacher Vergrößerung. Der Abstand zwischen den beiden Ligaturen betrug fast immer 8,5 mm, die Breite des Gefäßstreifens 8 mm. Die Gefäßstreifen wogen durchschnittlich 0,24 g.




Fig. 1. Schema der Versuchsanordnung.

K = Kymographion, *H* = Zweiarmiger Hebel, *L* = Laufgewicht, *W* = Wasserbad, *V* = Versuchszylinder, *P* = Präparat, *O* = Sauerstoffzuleitung, *M* = Mignonbrenner.

In den Versuchszylinder wurden 15—20 ccm Ringerlösung gegeben, welche bei der Mehrzahl der Versuche auf Körpertemperatur vorgewärmt war. Für die Gleichmäßigkeit der Temperatur bzw. die Durchmischung chemischer Reizflüssigkeiten sorgte ein Rührer in Form eines auf und ab zu bewegenden Glasringes. Durch ein den Boden durchbohrendes Glasröhrchen konnte Sauerstoff aus einem Gasometer zugeführt werden. Ein untergeschobenes Wasserbad erhielt die Temperatur auf Konstanz.

Für Reizungsversuche ist es, wie die Vorversuche ergaben, wichtig, die Dauerkontraktion der frisch dem Tier entnommenen Gefäße zu beseitigen. Nach Mac William rührt diese von mehreren Ursachen, dem mechanischen Reiz bei der Entnahme,

der Einwirkung des Luftsauerstoffs und der Abkühlung her, was, wie vorläufig erwähnt sei, durch meine Versuche Bestätigung fand.

Zur Beseitigung der Dauerkontraktion oder des »Tonus« wurde eine besondere Methode eingeführt, nämlich eine »Dehnung« des Präparates durch hohe Belastung mit 86,5 g während 15 Minuten vor Ingangsetzung des Versuches. Das Präparat befindet sich bereits während dieser Zeit in körperwarmer Ringerlösung. Durch die Belastung und die Wärme liefs sich die störende Dauerkontraktion schnell beseitigen. Die Länge des Streifens (zwischen den Ligaturen) vermehrte sich bis zu 22—23 mm. Die Retraktion nach Änderung der Spannung auf eine niedrigere, z. B. der viel angewendeten von 6,2 und 8,0 g, war nicht beträchtlich, sie betrug bis zu 1 mm. War die Spannung nach der Dehnung selbst ziemlich hoch, 51,4 g, so war die Retraktion = 0, d. h. der Hebel schrieb nach der Spannungsänderung merklich horizontal. Auf die Begründung der Vorteile der Dehnung werde ich im Zusammenhang mit der Erwähnung der Totenstarre und des Tonus der glatten Muskulatur kurz einzugehen haben.

Die meisten Experimente wurden als Parallelversuche gemacht, d. h. es wurde unmittelbar neben dem einen Ring ein zweiter von gleicher Gröfse entnommen, und unter genau gleichen Bedingungen präpariert. Das zweite Versuchsgläschen befand sich im nämlichen Wasserbad mit dem ersten, der zweite Schreibhebel schrieb an derselben Trommel. Mit diesem Zwillingspräparat konnte einerseits eine grofse Reihe paralleler Kontrollversuche, anderseits eine Reihe vergleichender Versuche angestellt werden.

Physikalische Eigenschaften des Streifens.

Für die Prüfung derselben, sowie auch für die Reizungen erwies es sich als sehr günstig, dafs die Gefäfsstreifen nicht wie andere glatte Muskelpräparate, z. B. Froschmagen (Schulz), Samenleiter (Nagel) etc. automatische Kontraktionen zeigen.

Der Streifen stellt sich hinsichtlich seiner Länge sehr langsam auf die gegebene Spannung ein, bei höherer Spannung wesentlich rascher — bei 85,4 g Spannung in durchschnittlich

32 Minuten — als bei niederer, wo die endgültige Einstellung des Hebels mehrere Stunden erfordert.

Die zyklische Deformation gibt dementsprechend einen großen Arbeitsverlust im Gefäßstreifen, verglichen mit dem Verhalten des Skelettmuskels unter gleichen Bedingungen.

Die beiden Kurven in Fig. 2 und 3 verdanke ich der Güte des Herrn Privatdozenten Dr. G. Sommer, dem ich auch an dieser




Fig. 2. Zyklische Deformationskurve eines Subclaviapräparates.




Fig. 3. Zyklische Deformationskurve. Semimembranosus-Semitendinosus vom Frosch.
(Ficksches Doppelmuskelpräparat.)

Stelle bestens danke. Die »verwüstete« Arbeit beträgt bei dem glatten Muskelpräparat (Fig. 2) 15 g/cm, bei dem quergestreiften 11 g/cm (Fig. 3), welche Differenz noch erheblich größer erscheint, wenn man die Längen und die Massen der Präparate vergleicht. Die Länge des quergestreiften Doppelmuskels betrug 7,7 cm, die des Subclaviastreifens 0,85 cm, das Gewicht der Froschmuskelsubstanz 3,45 g, das Gewicht des Subclaviastreifens 0,225 g.

Einfluß der Temperatur auf die Länge des Streifens.

Bei geringer Spannung, 3,5 g, zieht sich der (vorher nicht gedehnte) Streifen in Ringerlösung von niederer Temperatur langsam zusammen, in körperwarmer Ringerlösung dehnt er sich langsam aus, und zwar zunächst annähernd proportional der Zeit; z. B. bei $+7$ bis $+20$ verkürzte er sich pro Stunde um 0,25 mm.

Eigentümlich, sozusagen paradox, ist das Verhalten des Streifens bei allmählicher Anwärmung, beginnend bei einer Temperatur von ca. 10^0 bis zur Körperwärme (Kurve in Fig. 4). Bis zu einer bei 30^0 liegenden Temperatur zeigt der Streifen ganz regelmäÙig eine Verkürzung, von da ab eine erst raschere, dann allmähliche Verlängerung. Dieser Vorgang findet sich sowohl bei ziemlich niederer Spannung, wie 8 g, als auch ohne wesentliche Verschiedenheit bei hoher, wie 50 g. Am frischtoten Streifen (Tötung durch Brunnenwasser s. S. 35) wird die Erhebung in der Kurve nicht beobachtet, innerhalb der obigen Temperaturgrenzen verändert sich die Länge des toten Streifens überhaupt nicht merklich.

Physiologisches Verhalten.

Reizung durch plötzliche Erwärmung.

Durch raschen Temperaturwechsel von Kalt zu Warm kann ein deutlicher Wärmereiz gesetzt werden. Wird nämlich die im Versuchszylinder befindliche kühle Ringerlösung entleert und sofort erwärmte zugegossen, so tritt nicht unmittelbar die zu erwartende Verlängerung, sondern zunächst eine Verkürzung ein (Fig. 5), die als Reiz aufgefaßt werden muß, weil bei der Abkühlung des Streifens kein entsprechender Vorgang — vorübergehende Verlängerung des




Fig. 4. Subclavia 1 h p. m. Nicht gedehnt. 8 g Sp. Die Zahlen bedeuten Celsiusgrade.

Streifens — zu beobachten ist. Vielmehr ergibt sich bei raschem Temperaturwechsel von Warm zu Kalt gleichfalls eine Zusammenziehung des Präparates, von der es aber noch nicht sicher bewiesen ist, ob sie einen physiologischen (Kältereiz) oder physikalischen Vorgang darstellt.




Fig. 5. Subelavia 1 h p. m. 50 g Sp. Vorherige Dehnung mit 85 g bei 14°. Wärmereiz.¹⁾

Elektrische Reizung.

Zur Reizung dienten ausschließlich Öffnungsschläge eines Induktoriums, in dessen primären Kreis je nach Bedarf ein oder mehrere Akkumulatoren aufgenommen waren. Die Ringerlösung wurde kurz vor der Reizung entfernt, nachher, um Austrocknung zu verhindern, alsbald wieder zugegeben. Versuche, durch die Flüssigkeit hindurch zu reizen, ergaben keine befriedigenden Resultate. Zunächst sind sehr starke primäre Ströme nötig und selbst dann ist der Reizeffekt, auch bei engem Lumen (10 mm) des Glaszylinders, gering. Bei entleerter Flüssigkeit ist der Reizeffekt auf Kontrollpräparate sehr gleichartig (Fig. 6), offenbar, weil die nicht zu vermeidende Ungleichheit in der Anlegung der Elektroden an das Präparat im letzteren Falle ohne Belang ist.

Bei niederer Spannung, z. B. 5,5 g, verläuft die Zuckung nicht unwesentlich verschieden von der bei hoher Spannung. Der absteigende Ast der Kurve ist dann auf Stunden ausgedehnt. (Fig. 7.)

Eine sozusagen normale, vollständige Zuckungskurve eines frischen Präparates bei hoher Spannung zeigt Fig. 8. Aus-

1) Die Trommel dreht sich, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, mit gleicher Geschwindigkeit bei allen Versuchen. Es gilt also für die folgenden Kurven die nämliche Zeitschreibung wie in Fig. 5.

nahmsweise kommt auch bei hoher Spannung am frischen Präparat ein gedehnterer Kurvenverlauf zur Beobachtung. Bei





Fig. 6. Subclavia. Zwillingspräparate $2\frac{1}{2}$ h p. m. 51,4 g Sp. Öffnungsschlag 0 mm R.-A.




Fig. 7. Subclavia $5\frac{1}{2}$ h p. m. 5,6 g Sp. Öffnungsschlag 0 mm R.-A.




Fig. 8. Subclavia 8 h p. m. 51,4 g Sp. Öffnungsschlag 0 mm R.-A. 1 Minute = 2 mm.
Zuckungsdauer 40 Min.

älteren, absterbenden Präparaten ist der Verlauf bei jeder Belastung ein gedehnter.

Es ist schon aus den Versuchen von Schulz bekannt, und ich habe mich in eigenen Versuchen überzeugt, daß eine der-

artige Abhängigkeit der Zuckungsdauer von der Spannung beim Froschmagenstreifen nicht ausgesprochen ist.

Die Spannung von ca. 50 g dürfte annähernd äquivalent derjenigen sein, mit welcher das Gefäßstückchen im lebenden Tier beansprucht wird. Denkt man sich den Arterienring von 8 mm Breite, 5 mm lichter Weite und 1 mm Wandstärke halbiert von einem durch die Achse gelegten Schnitt, so wirkt ein Blutdruck von 200 mm Hg oder $2,72 \text{ g/mm}^2$ auf jede Hälfte mit einer Kraft von $40 \text{ mm}^2 \times 2,72 \text{ g/mm}^2 = 108,8 \text{ g}$. Auf jede der beiden Schnittflächen entfallen somit 54,4 g Spannung.

Reizschwelle.

Die Reizschwelle wurde für einen einmaligen Öffnungsschlag (1 Tauchelement, Schlitteninduktorium) bei 5—7 cm, bei einem besonders empfindlichen Präparat bei 9 cm Rollenabstand gefunden. Mehrmalige rasch hintereinander folgende Öffnungsschläge bei 9 cm Rollenabstand bewirken eine sehr deutliche Summation. Um maximale Erfolge zu erzielen, müssen sehr viel stärkere Ströme benutzt werden.

Latenzeit.

In Fig. 9 ist die Marke für den Öffnungsschlag durch einen Froschsartorius aufgezeichnet. Die Latenzzeit des Froschmuskels konnte bei der gegebenen Trommelgeschwindigkeit vernachlässigt werden.

Die Latenzzeit wurde in sieben Versuchen 30—80 mal größer gefunden als beim Skelettmuskel. Diese Verschiedenheit der Latenzzeiten unter sich rührt daher, daß auf genaue Gleichheit der Temperatur, welche ja die Latenzzeit erheblich beeinflusst, nicht geachtet wurde. Die Temperaturdifferenzen betrugen bis zu 3° . Es kam mir hier nur auf ungefähre Werte zum Vergleich mit der Skelettmuskulatur an.

Einfluß der Temperatur auf die Form der Zuckungskurve.

Derselbe ist leicht aus den abgebildeten Kurven (Fig. 10) zu lesen. Zwischen den einzelnen Reizungen wurde das Präparat wieder bis zur Ausgangslänge der ersten Reizung gedehnt und

gleichzeitig die Einstellung auf Temperaturkonstanz abgewartet. Die jeweilige Pause zwischen den Versuchen betrug 15 Minuten.




Fig. 9. Obere Kurve: Subel. 3 h p. m. 40 g Sp. Öffnungsschlag 0 mm R.-A.
Untere Kurve: Froschsartoriuszuckung als Marke für den Öffnungsschlag.
36 fache Hebelvergrößerung. Latenzzeit = 0,39 Sek.




Fig. 10. Subel. 13 h p. m. 3 Öffnungsschläge an demselben Präparat bei verschiedener Temperatur.

Einfluss des Alters des Präparates.

Bewahrt man Gefäßstückchen in Ringerlösung und niedriger Temperatur (Eisschrank, unmittelbar neben den Eisblöcken : 2—3°) und reizt man dann ausgeschnittene, nach obigen Angaben (Körperwärme, Dehnung) behandelte Gefäßstreifen, so zeigt sich, daß diese bis zu 13 Tagen reizbar bleiben. Innerhalb der ersten 6 Tage ist im allgemeinen die Zuckungshöhe nicht wesentlich vermindert, von da an nimmt sie ab und ist am 13. Tage auch

tration, Vorteile die bei den Untersuchungen am lebenden Tiere nicht erreicht werden können. Die Befürchtung, daß die Präparate außerhalb des Tieres bald absterben würden, ist nach



Fig. 11. Carotis 24 h p. m. 6,2 g Sp. Z. A = Adrenalin 1 : 50 000.




Fig. 12. Subel. 3 h p. m. 6,2 g Sp. A = Adrenalin 1 : 50 000. Z.

den elektrischen Reizversuchen, sowie nach den noch zu erwähnenden chemischen nicht berechtigt, da erstere ja eine unerwartete Überlebensfähigkeit des Präparates ergaben.

Die Figuren 11 und 12 zeigen eine Adrenalinreizung bei niederer Spannung, wobei die Reizlösung im Gläschen belassen

wird. Die untere Kurve ist jeweils durch das Parallelpräparat geschrieben. Der Anstieg der Kurve beginnt innerhalb weniger Sekunden nach der Zugabe des Adrenalins und dem Rühren. Eine genaue Bestimmung der Latenzzeit läßt sich natürlich nicht geben. Die Reizung der Parallelpräparate hat hinsichtlich der Gleichheit des Reizeffektes einen sehr befriedigenden Erfolg.



Fig. 13. Subcl. 2 h p. m. 51,4 g Sp. A = Adrenalin 10^{-6} . 1 Minute = 2 mm.




Fig. 14. Subcl. $1\frac{1}{2}$ h p. m. 40 g Sp. A = Adrenalin 10^{-7} . E = Entleerung der Adrenalin-ringerlösung und Zugabe frischer vorgewärmter Ringerlösung.




Fig. 15. Subcl. $1\frac{1}{2}$ h p. m. Dieselben Versuchsbedingungen wie in Fig. 14.

Die Kurve bleibt bei dieser Versuchsanordnung für Stunden auf ihrer Höhe. Auch bei Durchspülung frischer Ringerlösung durch den Versuchszylinder bleibt die Kontraktion sehr lange bestehen, worauf ich bei den Auswaschversuchen zurückkomme.

Die Kontraktionsdauer zeigt sich abhängig von der Spannung. Sie ist bei hoher Spannung viel kürzer, vorausgesetzt, daß die Reizlösung abgelaufen und durch adrenalinfreie Ringerlösung, eventuell in mehrfacher Wiederholung, ersetzt wird. (Fig. 13.)

Speziell bei niederen Adrenalkonzentrationen kehrt die Kurve rasch wieder zur Abszisse zurück. Man kann also mit dieser Anordnung den Vorgang im lebenden Tier, wo der Blutdruck bekanntlich schnell wieder absinkt, nachahmen. (Fig. 14, 15.)

Ein wesentlicher Unterschied zwischen elektrischer und Adrenalinreizung zeigt sich darin, daß

I. bei niederer Temperatur das Präparat durch Adrenalin nicht erregt wird. S. Fig. 16. Der wirksame Temperaturbereich für Adrenalinreizung beginnt bei etwa 25° .

II. Der Anstieg der Adrenalinkurve dauert im allgemeinen länger.

III. Das aufbewahrte Präparat verliert die Empfindlichkeit für Adrenalin früher als die für elektrische Reizung. Sie ist für




Fig. 16. Subel. 10 h p. m. Zwillings- (Parallel-) Präparate. 6,2 g Sp. A = Adrenalin (0,3 mg) = 1 : 50 000. Oberes Präparat in Ringerlösung von 15° , unteres in Ringerlösung von 37° .

ersteres unter Umständen erloschen, für letztere am gleichen Präparate noch recht deutlich. S. Kurven in Fig. 17a und vergleiche S. 39 und Fig. 50.

Das dauernd in Wärme gehaltene Präparat läßt sich analog dem für elektrische Reizungen S. 13 angegebenen Verhalten mehrmals nacheinander durch Adrenalin reizen. Werden hohe Adrenalinkonzentrationen angewendet, so ist eine Entfernung bzw. Auswaschung der Reizlösung nötig, um mehrere Reize an demselben Präparat setzen zu können (vgl. S. 20, 21). Wiederum erlischt hierbei die Erregbarkeit für Adrenalin früher als für elektrische Reize.

Wirksame Konzentrationen des Adrenalins.

Die Schwellenkonzentration für Adrenalin wurde mit dieser Methode bei einer Verdünnung von 10^{-9} oder von 0,000015 mg auf 15 ccm Ringerlösung bzw. 0,00006 mg auf 1 g Gefäfs gefunden.

Bei einer so wirksamen Substanz schienen zur Schwellenwertbestimmung besondere Maßregeln und Kontrollvorrichtungen geboten. Für die Stammlösung und für jede weitere Verdünnung wurden eigene Pipetten und sorgfältig gereinigte Reagenz-




Fig. 17a. Kontraktionen von 4 Streifen aus einer Carotis, am 3., 6., 7. und 10. Tage p. m.
A = Adrenalin (0,3 mg) 1 : 50 000. O = Öffnungsschlag.




Fig. 17b. Subel. 1 $\frac{1}{4}$ h p. m. 6,2 g Sp. A = Adrenalin 0,000015 mg auf 15 ccm Ringerlösung
= 1 : 1000 Millionen.

gläser verwendet. Die zu der Ringerlösung im Versuchsgläschen hinzuzugebende Adrenalinringerlösung von 2 ccm wurde auf Körpertemperatur vorgewärmt; entsprechende Kontrollversuche durch Zugabe von 2 ccm reiner Ringerlösung und Bewegung der Rührer wurden gemacht.

Nicht alle Präparate sind für Adrenalinkonzentrationen unter 1 : 100 Millionen empfindlich, aber doch ein großer Teil. Mit

steigender Konzentration wächst die Verkürzungsgröfse (Fig. 18). Als Konzentration mit maximalem Reizerfolg ist Adrenalin in der Verdünnung 1 : 50 000 zu betrachten. Bei einzelnen Präparaten war sie 1 : 100 000.




Fig. 18. Subel. 2½ h p. m. 6,2 g Sp. Adrenalin in steigenden Konzentrationen.




Fig. 19. Subel. 27 h p. m. 6,2 g Sp. Adrenalin 10^{-7} . Z.




Fig. 20. Subel. 6 h p. m. 6,2 g Sp. A = Adrenalin. Z.

Betont sei die Gleichheit der Resultate, die die Methode zu gewissen quantitativen und vergleichenden Untersuchungen geeignet macht. Zu solchen wurden stets Zwillingspräparate verwendet. Kurven von maximaler Adrenaliureizung an Zwillingspräparaten sind S. 14 abgebildet. Die Fig. 19—21 sind Reproduktionen von Reizungen mit niederen Konzentrationen.

Bei derartigen Versuchen, von denen eine größere Reihe mit demselben Resultat bezüglich der Kontraktionshöhen ausgeführt wurde, ist natürlich die nötige Vertrautheit mit der Methode und möglichst gleichartige Präparation der beiden Streifen Voraussetzung. — Von Methoden, die eine physiologische Wertbestimmung gestatten und zu systematisch quantitativen Untersuchungen verwendet sind, fand ich, genau genommen, trotz der umfänglichen Literatur, nur¹⁾ die der Lävén'schen Versuche, auf die ich zum Vergleich hinweisen möchte.




Fig. 21. Subcl. 2 h p. m. 6,2 g Sp. A = Adrenalin 1 : 10⁷. Z.

Lävén fand sein Präparat — es handelte sich um Durchströmungsversuche durch einen Teil des Gefäßgebietes überlebender Frösche — noch deutlich für eine Adrenalindosis von 0,0002 mg in der Verdünnung von 1 : 50 Millionen empfindlich.

Es ist wohl von Interesse, einige ebenfalls in sehr geringen Mengen wirkende Stoffe zum Vergleich heranzuziehen: Das Kupfer in destilliertem Wasser wirkt nach Nägeli in Verdünnung von 1 : 77 Millionen tödlich auf Spirogyren. Nach Pfeffer werden gewisse Anilinfarben noch nachweisbar in der Verdünnung von 1 : 100 Millionen von Pflanzenzellen aufgenommen.

Die Auswaschbarkeit des Adrenalins

läßt sich mit der angewendeten Methode gleichfalls nachweisen. In Fig. 22a wird bei dem oberen Präparat nach der Reizung mit Adrenalin die Reizlösung entfernt und andauernd frische Ringerlösung, im ganzen 1300 ccm, durch den Versuchszylinder gespült.

1) Vorliegende Arbeit wurde im wesentlichen vom August 1904 bis Februar 1905 ausgeführt. In einer späteren Arbeit hat Ehrmann (Archiv f. exp. Pathol. u. Pharmak. Bd. 53 S. 1 u. 2) gleichfalls eine physiologische Wertbestimmung angestrebt. Er benutzt die erweiternde Wirkung des Adrenalins auf die Pupille.

Die Kurve sinkt deutlich, wenn auch gering (niedere Spannung) wieder zur Abszisse ab, während das Kontrollpräparat nach der Kontraktion eine zur Abszisse annähernd parallele Linie schreibt. Das obere Präparat ist dann im Gegensatz zum




Fig. 22a. Subel. 10 h p. m. Z. 6,2 g Sp. A = Adrenalin (0,3 mg $\Rightarrow$ 1 : 50 000. Beim Präparat der oberen Kurve Durchspülung von 1300 ccm Ringerlösung durch den Versuchszylinder.¹⁾ 1 Minute = 1 mm.




Fig. 22b. Subel. 1 $\frac{1}{2}$ h p. m. 51,4 g Sp. Zwei einander unmittelbar folgende Reizungen des gleichen Streifens mit Adrenalin 10^{-5} . W = dreimaliger Wechsel der Ringerlösung. 1 Minute = 2 mm.

Kontrollpräparat wieder durch Adrenalin reizbar. Diese zweite Kontraktion ist gering, weil der Streifen noch stark verkürzt war. Würde das Präparat auf die Ausgangslänge zurückgekehrt sein, so wäre die zweite Kontraktion mit der ersten nahezu identisch, wie andere Versuche bei hoher Spannung, vgl. Kurve in Fig. 22 b, zeigten. Bei letzteren erwies sich ein

1) Die kleine Erhebung in der oberen Kurve nach der Adrenalin-kontraktion ist durch einen anfänglichen, nicht vermeidbaren Temperaturunterschied der Durchspülungsflüssigkeit bedingt.

3—5 maliger Wechsel der Ringerlösung (jedesmal 30 ccm in Pausen von 2—3 Minuten) genügend, um die Kurve zu relativ baldigem Absinken zu bringen. Für die Auswaschung des Adrenalins ist auf solche Weise ein Beweis gegeben, da ja bei Belassung der Reizlösung im Gläschen die Kurve auch bei hoher Spannung lange Zeit, $2\frac{1}{2}$ —3 Stunden, braucht, um zur Abszisse zurückzukehren. Immerhin läßt sich einwenden, daß das Abklingen der Adrenalinwirkung bei diesen wenigstens 45 bis 50 Minuten dauernden Versuchen zum Teil auf einer Zerstörung des Adrenalins (s. u.) beruht.

Dieselbe Frage habe ich daher noch in einer anderen Weise zu beantworten gesucht. Ein Gefäßstreifen wurde für 8 Minuten in erwärmter Ringerlösung mit Adrenalin 1 : 10000 gebracht, dann herausgenommen, mit Watte abgetrocknet und Ringerlösung abgespült, sodann zwischen Filtrierpapierlagen abgetrocknet. Hierauf wurde er in 20 ccm Ringerlösung getaucht und in dieser 5 Minuten unter mehrfachem Umschütteln belassen. Die letztere Lösung, einem zweiten Präparate zugegeben, bewirkt eine typische Adrenalinreizung. Fig. 23.



Fig. 23. Subel. 3 h p. m. 14,2 g Sp. Reizung mit »ausgewaschenem« Adrenalin.

Die Adrenalinmenge, die auf diese Weise in die Lösung übergeht, muß gering sein, da die Kontraktionshöhe nicht bedeutend ist (etwa entsprechend einer Reizung mit Adrenalin 1 : 20 Mill.). Man muß sich fragen, ob wenig Adrenalin gebunden oder nur wenig auswaschbar ist. Es sind beide Alternativen möglich. Der folgende Versuch beweist aber, daß es sich um die Aufnahme geringer Mengen von Adrenalin handelt. Wenn man mit einer Reizlösung zwei Zwillingpräparate hintereinander reizt, so fällt die Kontraktion bei dem zweiten nur wenig geringer aus, so daß von der ohnehin sehr geringen Menge von Adrenalin,

die zur Reizung verwendet wurde, nicht viel gebunden worden sein kann. Fig. 24, 25.




Fig. 24. Subel. 1½ h p. m. 14,2 g Sp. Z.
Reizung erst des oberen, dann des unteren
Präparates mit einer Adrenalinlösung.




Fig. 25. Subel. 2 h p. m. 14,2 g Sp.
Z. Reizung wie in Fig. 24.

Blutdruckerniedrigende Substanz.

Abel (zitiert nach Goldschmitt) und Gürber haben eine solche aus der Nebenniere gewonnen. Auch ich machte eine Beobachtung, die auf das Vorhandensein einer blutdruckerniedrigenden Substanz gedeutet werden kann. Ich habe anfangs eine Anzahl Versuche mit Suprarenaltablids von Burroughs Wellcome, London, angestellt. Diese Tabletten enthalten die gesamte Nebennierensubstanz. Ein wässriges Extrakt aus drei bis vier zerriebenen Tabletten auf 10 ccm Ringerlösung, bei Zimmertemperatur 1—3 Stunden extrahiert, wirkt, auf einen Froschmagenstreifen aufgeträufelt, im Sinne einer tonischen Dauererregung oder auch einer kürzeren Kontraktion (Fig. 26, 27), indes sonst das gekochte Tablettenextrakt, bzw. Adrenalin, auf die Darm- und Magenperistaltik inhibierend bzw. darmerschlafend wirkt, wie aus der Literatur bekannt ist und nachher noch zu erwähnen sein wird. Von dieser ersten Beobachtung ausgehend, versuchte ich, ob diese umgekehrte, am Magen gefundene Wirkung auch am Gefäß dem Adrenalin entgegengesetzt wirkt, was in der Tat der Fall ist.

Dafs eine nur schwach ausgesprochene Erschlaffung am Gefäßstreifen bzw. Kontraktion am Darm eintritt, ist weiter nicht befremdlich, da ja beide Substanzen, die blutdruckerhöhende und

die blutdruckerniedrigende, in dem Extrakt vorhanden sind. Über die blutdruckerhöhende (darmlähmende) Wirkung des gekochten Extraktes s. S. 28.

Versuche mit dem nach Angaben Gürbers hergestellten blutdruckerniedrigenden Extrakt aus Nebennierensubstanz brachten



Fig. 26. Froschmagenstreifen. Das Aufhören der spontanen Kontraktionen ist abgewartet. Bei *T* Aufträufeln von Tablettenextrakt (s. Text). 1 Minute = 2 mm.




Fig. 27. Froschmagenstreifen. Vorherige Ausschaltung der spontanen Kontraktion durch Suprarenin 1 : 50 000. *E* = Aufträufeln 1 ccm Tablettenextrakt. *R* = Aufträufeln von Ringerlösung zur Kontrolle.

an dem Gefäßstreifen keine Erschlaffung oder Lähmung zuwege. Der in dem Extrakt befindliche Streifen bleibt für Adrenalinreizung gut empfindlich.¹⁾ In den Blutdruckkurven von L. Metzger kommt die blutdruckerniedrigende Wirkung des nach Gürbers Angaben gewonnenen Extraktes jedoch sehr deutlich zum Ausdruck (zentrale Wirkung?).

Zerstörung des Adrenalins.

In den Blutdruckversuchen am lebenden Tier geht bei intravenöser Einspritzung die Adrenalinwirkung sehr rasch vorüber und ist nach einer Viertelstunde abgeklungen. Bei subkutaner Injektion bleibt sie bis zu mehreren Stunden bestehen. Wie wird das Adrenalin zerstört?

Wenn diese Frage zumeist nur für den lebenden Organismus gestellt worden ist, so ließen sich doch auch an überlebenden Präparaten (vgl. die Lävewschen Versuche an überlebenden Fröschen) Erfahrungen über den fraglichen Punkt sammeln.

1) In einem der diesbezüglichen Versuche mit ungekochtem Tablettenextrakt ($7\frac{1}{2}$ Tabletten auf 16 ccm Ringer, 4 h bei 15° extrahiert) wurde der Versuchszylinder erst mit diesem Extrakt beschickt. Eine dann versuchte Reizung mit Adrenalin 1 : 50 000 blieb unbeantwortet.

Sicher ist die Gefäßwand imstande Adrenalin zu zerstören, wie ein sinnenfälliger Beweis dartut. 0,15—0,3 mg Adrenalin in 15 ccm Ringerlösung, also $1-2 \cdot 10^{-5}$, geben im Reagenzglas nach 3—5stündigem Stehen in Zimmertemperatur, rascher bei Körpertemperatur als Zeichen beginnender Zerstörung durch die Oxydation die bekannte, charakteristische Färbung des »Oxyadrenalin«. Zunächst entsteht eine schöne eosinähnliche Rosafärbung. Diese kann gewissermaßen als Indikator benutzt werden. Denn eine solche Adrenalinringerlösung gibt in dem mit einem Präparat beschickten Versuchszylinder keinen Farbumschlag. Das Fehlen der Farbenänderung kann nicht allein auf Speicherung des Adrenalins bezogen werden, weil die vorhandene Adrenalinmenge zu groß ist. (Vgl. hierzu S. 21 und Fig. 23—25.) Es wird also mindestens ein großer Teil des Adrenalins zerstört. Gibt man mehr Adrenalin, beispielsweise 1,5 mg in 15 ccm Ringer (10^{-4}), so tritt die Rosafärbung alsbald auf, d. h. diese Menge Adrenalin vermag das Präparat nicht mehr zu zerstören bzw. zu binden.

Ein Faktor für die Zerstörung des Adrenalins ist unzweifelhaft der Sauerstoff. Eine luftdicht verschlossene Lösung hält sich monatelang ohne Farbenänderung.

Die Auswaschbarkeit des Adrenalins ist, wie gezeigt, nachweisbar.

Die drei Faktoren, Zerstörung durch das Gewebe, durch den Sauerstoff und Ausspülung kommen im lebenden Organismus ebenso gut in Betracht und werden auch für die Theorie von der Zerstörung des Adrenalins von den verschiedenen Autoren in Anspruch genommen. Nach Versuchen von Harry und Weifs, ferner von Ehrmann würden sie aber nicht hinreichen, das Adrenalin so schnell zu zerstören. Harry und Weifs verfahren bei ihren Versuchen unter anderem so, daß sie einer Katze Adrenalin injizierten, eine Blutdruckmessung vornahmen, und als die darin zum Ausdruck kommende Adrenalinwirkung abgeklungen war, von dem Blut des ersten Tieres einem zweiten injizierten. Hierbei zeigte sich eine deutliche verhältnismäßig hohe Blutdrucksteigerung, welche die Verfasser als durch noch vorhandenes

Adrenalin bedingt auffassen. Sie vermuten, daß eine »Ermüdung« oder »Gewöhnung« der Gefäßmuskulatur an das Gift das rasche Abklingen der Adrenalinwirkung verursache. Gegen diese Vermutung spricht die an unserem Präparat gemachte Erfahrung, daß die Adrenalincontraktion auch bei hoher Belastung stundenlang anhält.

Da vorläufig die obigen Gründe, Oxydation etc., für die Erklärung der raschen Aufhebung der Adrenalinwirkung im lebenden Körper nicht auszureichen scheinen, so möchte ich für dieses Verhalten eine andere Hypothese aufstellen. Wie erwähnt, sprechen gewisse Untersuchungen, sowie eigene Versuche für einen Gegenstoff des Adrenalins. Gegenstoff, wie die blutdruckerniedrigende Substanz kurz bezeichnet sei, ist hier natürlich nicht im Sinn Ehrlichscher Theorien gemeint. Der Gegenstoff ist ja im Körper, in der Nebenniere bereits vorhanden und mag sehr wohl bei dem raschen Abklingen der Adrenalinwirkung eine Rolle spielen, gewissermaßen an die gefährdete Stelle von der Nebenniere oder vom Gewebe aus hinbeordert werden. Danach müßte man im lebenden Körper zwischen der Inaktivierung und der Zerstörung des Adrenalins unterscheiden. An dieser Stelle ist es wohl zu erwähnen, daß dem Adrenalin eine alkaloidähnliche Wirkung zugeschrieben wird. In der Tat, wenn man die Wirkungen eines genauer untersuchten Alkaloids (Straubs Versuche mit Veratrin am Aplysienherzen) vergleicht, zeigt sich, daß für die beiden Gifte Auswaschbarkeit, Zerstörung durch die Zelltätigkeit und als wesentlich eine Elektion durch bestimmte Zellen (s. S. 39, 40), spezifische Affinität, wie z. B. auch beim Strychnin für das Rückenmark, nachweisbar sind.

Eine adrenalinähnliche Substanz im Blute.

Batelli behauptet, im Blutserum Adrenalin nachgewiesen zu haben. Durch ein im Original nachzusehendes Verfahren »konzentrierte« er das im Hundeblutserum enthaltene Adrenalin. Er injizierte das Präparat Hunden und bestimmte durch vergleichende Blutdruckversuche nach Adrenalininjektionen die Konzentration des Adrenalins im Blut = $5 \cdot 10^{-8}$. Ehrmann

(s. Anmerkung, S. 19) fand im Blut, das der Vena cava inferior entnommen war, Adrenalin.

In eigenen Untersuchungen verfuhr ich folgendermaßen. Der Gefäßstreifen wurde wie gewöhnlich vor dem Versuch in Ringerlösung gedehnt, der Versuch in Gang gesetzt, die Ringerlösung entfernt und vorgewärmtes defibriertes Rinderblut oder Serum (30 Minuten zentrifugiert) in den Versuchszylinder gegeben. In einer Reihe von Versuchen zeigte sich jedesmal eine Kontraktion, die durchaus einer Adrenalinkontraktion ähnlich sieht. (Fig. 28—30.)




Fig. 28. Subcl. $\frac{3}{4}$ h p. m. 14,2 g Sp.
S = 20 ccm Blutserum (Rind).




Fig. 29. Subcl. $\frac{3}{4}$ h p. m. Z. 14,2 g Sp. B = defibriertes Blut. S = Serum von demselben Blut.

In Fig. 30 dient das (Zwillings)-Präparat der unteren Kurve als eine Art Titre; es wird mit Adrenalin gereizt, das Präparat der oberen Kurve mit Serum.

Ferner wurde Rinderblutserum enteiuweist, wobei ungefähr eine dreifache Verdünnung stattfand. Es wirkt das Filtrat im Sinn einer Adrenalinreizung, wobei es nochmals 1 : 100 verdünnt wurde. (Fig. 31.)

Nach diesen Versuchen erscheint die Vermutung berechtigt, daß in dem Adrenalin ein Regulativ der Weite des Gefäßsystems gegeben ist.

Dem Adrenalin verwandte Stoffe.

Suprarenin, das Nebennierenpräparat der Höchster Farbwerke, ist nach mehrfachen Behauptungen chemisch identisch mit Adrenalin. Die nachstehende Kurve zeigt, daß sich dies physiologisch nachweisen läßt. (Fig. 32.)

Zwei weitere Versuche ergaben das gleiche Resultat.

»Soloid Hemisine« Tabletten von Burroughs Wellcome sollen gleichfalls das isolierte wirksame Prinzip der Nebennieren




Fig. 30. Subcl. $8\frac{1}{4}$ h p. m. 14,2 g Sp. S = 20 ccm Rinderblutserum $10\frac{1}{2}$ h nach der Entnahme. A = Adrenalin 0,28 mg auf 20 ccm Ringerlösung. Z.




Fig. 31. Subcl. $3\frac{1}{2}$ h p. m. 14,2 g Sp. S = 20 ccm enteiweißtes Serum, 300 fach verdünnt.




Fig. 32. Subcl. 60 h p. m. 6,2 g Sp. Z. S = Suprarenin und Adrenalin in gleichen steigenden Konzentrationen.

darstellen. Sie sind sehr leicht löslich. Neben dem Vorzug höchst kompender Form haben sie den ausgezeichneten Wirkbarkeit und Haltbarkeit. Der Versuch in Fig. 33 ist mit 6 Monate im Anbruch befindlichen Tabletten gemacht.

Von den Suprarenaltabloids der nämlichen Firma sollen, wie mir die Fabrik mitteilte, 1—3 Stück zu 3,5 ccm Kochsalzlösung gegeben und 10 Minuten aufgekocht werden. Das Filtrat wirkt, abgesehen von der etwas umständlichen Herstellung und




Fig. 33. Subcl. 32 h p. m. 6,2 g Sp. Z. SH = Soloid Hemisine.




Fig. 34. Subcl. 58 h p. m. 6,2 g Sp. Z. T = 0,15 ccm gekocht. Tablettenextrakt (hergestellt aus 2 Tabl. auf 3,5 ccm). A = 0,15 ccm der Stammlösung = 0,15 mg Adrenalin.

der ungenauen Dosierung, nicht in dem Mafse kontrahierend wie die anderen Präparate. (Fig. 34.) Die Haltbarkeit dagegen ist eine sehr gute. Das kalt extrahierte, unverdünnte Extrakt hat, wenigstens wenn es nur 1—3 Stunden extrahiert wird, die oben charakterisierte Wirkung.

In den meisten Versuchen wurde Adrenalin verwendet, das vorzüglich haltbar ist. Die Rosafärbung tritt, auch wenn die Flasche täglich geöffnet und mit der Pipette von dem Inhalt genommen wurde, erst nach Wochen oder Monaten auf. Solange

die Verfärbung keine intensive ist, ist eine Beeinträchtigung der Wirksamkeit kaum merklich.

Auf Veranlassung von Herrn Dr. Gürber machte ich Versuche mit Prefsstoff¹⁾, der aus 10 zerkleinerten Nebennieren unter 600 Atmosphären Druck hergestellt wurde. Es ließen sich etwa 15 ccm gewinnen. 0,02 ccm auf 20 ccm Ringer bewirken eine sehr kräftige Kontraktion des Gefäßstreifens. (Vgl. Fig. 56.)

Im Anschluß hieran berichte ich über einige Versuchsergebnisse mit Präparaten pflanzlicher Provenienz, die als blutdrucksteigernde oder hämostyptische Mittel bekannt sind. Für Digitalis haben schon Oliver und Schäfer festgestellt, daß seine



Fig. 35. Subel. 8 h p. m. 6,2 g Sp. E = Ergotin.

Wirkung eine unvergleichlich geringer blutdrucksteigernde ist als die des Nebennierenextraktes. Nach eigenen Versuchen mit Ergotin, Helleborein und Stypticin kann ich diese Angabe bestätigen. In niederen Konzentrationen, unter 10^{-3} , wird eine deutliche Kontraktion am Gefäßstreifen nicht gefunden. Am kräftigsten wirkt das Ergotin (Fig. 35). (Vgl. dagegen die Ergotinwirkung am Uterus im folgenden Abschnitt). Helleborein (Merck), das am besten die in Wasser leicht löslichen Gifte der Digitalisgruppe repräsentiert (Schmiedeberg), ließ gleichfalls in der Konzentration 10^{-3} eine Wirkung erkennen, jedoch in Form einer geringen und träg ansteigenden Kontraktion. Stypticin (Merck) bewirkt am Gefäßstreifen keine Kontraktion.

Adrenalinwirkung auf andere Gefäße und einige andere Organe.

Es war anzunehmen, daß eine so aktive Substanz auch auf andere Organe Einwirkungen ausübe. In der Tat zeigte sich,

1) Bevor die Isolation des wirksamen Prinzips gelungen war, wurden wässrige oder Glyzerinauszüge bzw. Dekokte aus zerkleinerten Nebennieren, späterhin auch die oben erwähnten Tabloids angewendet.

— auch Oliver und Schäfer machten bereits Versuche in dieser Richtung — daß die glatte Muskulatur im allgemeinen durch Adrenalin beeinflusst wird, und zwar im Sinne von Kontraktion oder Lähmung (Erschlaffung).

Meine diesbezüglichen Versuche haben zum Teil nur den Wert einer Orientierung, inwiefern sich die hier eingeschlagene Untersuchungsmethode auch auf andere Organe übertragen liefse. Die Untersuchung der Lungengefäße beansprucht ein größeres Interesse. Die lähmende Wirkung auf die Magenmuskulatur — auf die ich bereits mehrmals hinwies — ist von Boruttau, Langley und anderen Autoren erwähnt. Boruttau




Fig. 36. Froschmagenband, 4 g Sp. T = gekochter Tablettenextrakt.

hat sie auch schon für den Froschmagen festgestellt. Sie scheint für den ganzen Magendarmtrakt zu gelten. Am Ösophagus der Schildkröte hat Botazzi nachgewiesen, daß Adrenalin die spontanen Kontraktionen aufhebt, für den Kaninchendarm Magnus und andere. Die nachstehende Kurve ist von einem Froschmagenring geschrieben, der in der von Schulz angegebenen Weise präpariert und mit dem Schreibhebel verbunden ist. In Verdünnung von $1:10^6$ wurde ein sehr rasches Sistieren der rhythmischen Kontraktionen beobachtet. In der Verdünnung von $1:10^5$ und $2:10^5$ hörten dieselben für eine Stunde, zumeist sogar dauernd auf.

Nach diesen Beobachtungen an Reptilien- und Amphibienorganen scheint das Adrenalin eine weit verbreitete Wirksamkeit zu besitzen. Ich machte bisher nicht angestellte diesbezügliche Versuche an Fischmagen (Barsch und Aal). Bei

dem letzteren sind die Nebennieren anatomisch recht verschieden von denen der höheren Tiere gestaltet. Mark und Rindenschicht werden durch je ein eigenes Organ repräsentiert (Leydig zitiert nach Goldschmitt). Auch beim Aal, der im Gegensatz zu höheren Tieren die Nebennierenexstirpation monatelang überlebt, läßt sich die hemmende Wirkung des Adrenalins auf die rhythmischen Kontraktionen eines Magenringes deutlich nachweisen.

An kleinen ausgeschnittenen Stückchen der Kaninchenblase, die analog den Gefäßstreifen präpariert wurden, kon-




Fig. 37. Uterus, Kalb, 10 h p. m. 3 g Sp. $E = \text{Ergotin}$.



Fig. 38. Vena jugularis (Rind) 2 h p. m. 4,1 g Sp. $A = 1 : 50\,000$.

statierte ich bei Zugabe von Adrenalin in der Verdünnung 10^{-7} und 10^{-6} eine schwache Kontraktion.

Am exzidierten überlebenden Kaninchenuterus in toto hat Kurdinowsky Versuche angestellt und gefunden, daß Adrenalin Kontraktionen hervorruft, die intensiver zu sein pflegen als die durch Ergotinpräparate. Die Kurve in Fig. 37 stammt von einem ca. 3 cm langen und 1 cm breiten Stückchen aus dem Uterus eines Kalbes. Der Streifen wurde wie ein Gefäßpräparat im Versuchszylinder befestigt und mit einer Ergotinlösung gereizt. In einem Versuch, wo das Präparat mit Adrenalin und mit Ergotin gereizt wurde, zeigte sich die Adrenalin-contraktion in der Tat etwas stärker.

Auf Venenstreifen (Vena jugularis vom Ochsen) wirkt Adrenalin gleichfalls kontrahierend. In Fig. 38 ist die Kontraktion eines Längsstreifens aus der Vene aufgezeichnet; ein Stück aus einem aufgeschnittenen Ring kontrahierte sich merk-

würdigerweise nicht. (Vielleicht verlaufen die glatten Muskelfasern in diesem Präparat vorzugsweise in der Längsrichtung.)

Lungengefäße.

An diesen soll die kontrahierende Wirkung des Adrenalins versagen. Speziell Brodie und Dixon stellten in ihren Durchströmungsversuchen an überlebenden Säugetieren fest, daß der Druck im Lungenkreislauf durch Adrenalinlösungen nicht, dagegen in anderen Gefäßgebieten deutlich erhöht wird. Sie schlossen hieraus, daß die Lungengefäße eine Sonderstellung




Fig. 39. Lungenarterie. 10 h p. m. 14,2 g Sp.




Fig. 40. Lungenarterie. 2 h p. m. 8 g Sp. Kontraktion auf Öffnungsschlag, mit Superposition einer zweiten.

einnehmen und nicht vasomotorisch innerviert sind. Daraus aber, daß Bariumchlorid, das muskulär wirken soll, auch die Lungengefäße kontrahiert, folgern sie, daß Adrenalin nicht muskulär, sondern auf die Nervenendigungen wirkt.

Eine Besprechung der Literatur über die Wirkung des Adrenalins auf die Lungengefäße findet sich in der eingangs erwähnten Arbeit von Möller. Die Ansichten der Autoren gehen gleich der von Brodie und Dixon dahin, daß Adrenalin entweder gar nicht oder sehr schwach auf die Lungengefäße wirke. Möller spricht sich nach eigenen Versuchen an Froschlungen gegen die Wirksamkeit des Adrenalins aus.

Mehrere Versuche an Lungengefäßen nach der hier angegebenen Methode ergaben unzweifelhaft die Wirksamkeit des Adrenalins auch auf diese Präparate. Die Kontraktionen, Fig. 39, sind sehr deutlich, wenn auch schwächer als z. B. an Subclavien und Karotiden. Es erklärt sich dies daher, daß die betreffenden Gefäße, die zwar ein nicht viel geringeres Kaliber wie Carotiden hatten, eine schwächere Musku-

latur aufweisen. Dies sieht man leicht makroskopisch, ferner auch an der Höhe der Kontraktion auf Öffnungsschlag.

Einige Experimente führte ich am lebenden Tier aus.

Ätherisierten Kaninchen wurde die Bauchhöhle eröffnet und 5 ccm einer 1 : 10000 Adrenalinlösung in eine Darmschlinge injiziert. Die Peristaltik des betreffenden Darmabschnittes (Dickdarm) wurde auf mehrere Zentimeter weit aufgehoben, während sie in den anderen Darmpartien sehr lebhaft war.

Subkutane Injektionen in Kaninchenohren mit dem, wie oben näher angegeben, bei Zimmertemperatur gewonnenen Extrakt aus Nebennierentabletten wurden nicht mit einer Erblassung des Gewebes beantwortet, wie dies bei dem gekochten Extrakt der Fall ist. Es schien mir diese Injektion vielmehr eine Hyperämie hervorzurufen, welche aber schliesslich eine Folge der mechanischen Reize sein könnte.

Atropin.

Am körperwarmen Gefäßspräparat erfolgt auf Zugabe von Atropin eine Erschlaffung. Fig. 41.



Fig. 41. Subcl. 2½ h p. m. 6,2 g Sp. At = Atropin 1 : 2000.

Bei niedrigerer Temperatur, 12°, tritt diese Wirkung so gut wie nicht ein; ebenso nicht an älteren Präparaten, an denen Adrenalin nicht mehr kontrahierend wirkt.

Bei elektrischer Reizung eines mit Atropin (1 : 2000) 20 Minuten vergifteten, frischen Präparates fällt die Zuckung deutlich und konstant weniger kräftig aus als am unvergifteten Kontrollpräparat. Fig. 42. Dagegen ist die Zuckung des längere Zeit in körperwarmer Atropinringerlösung befindlichen Präparates annähernd gleich hoch der des unvergifteten Präparates. Fig. 43. [Der Anschauung, daß Atropin als Nervinum wirkt (vgl. hierzu »Angriffspunkt des Adrenalins« S. 37 ff.), widerspricht an diesen Befunden nur die verminderte Zuckung des kurze Zeit der Wärme

ausgesetzten, frischvergifteten Präparates. Man könnte dies mit einer Reizung auf die dann noch intakten dilatatorischen Nervenapparate erklären, welche dem Kontraktion bewirkenden elektrischen Schlag entgegensteht.]




Fig. 42. Subcl. 1 h p. m. 51,4 g Sp. Z. Obere Kurve von einem Präparat, das bis zur Reizung durch den Öffnungsschlag in Atropinring (1 : 2000) sich befindet.




Fig. 43. Subcl. 8 h p. m. 51,4 g Sp. Obere Kurve von einem Präparat, das sich seit 5 h in körperwarmer Atropinringlösung 1 : 1000 befindet. Untere von dem unvergifteten Zwillingspräparate.

In der Konzentration von $2 \cdot 10^{-5}$ läßt sich noch eine erschlaffende Wirkung des Atropins konstatieren, bei 10^{-5} ist sie nicht mehr sicher bemerklich.

Die lähmende Wirkung auf die Froschmagenkontraktionen ist auch bei ziemlich hoher Konzentration nicht sicher zu erreichen.¹⁾ Schulz hat zu diesem Zweck eine sehr hoch konzentrierte Lösung, 1 : 100, angewendet, womit er die Präparate betupfte. Wenn ich zum Zweck elektrischer Reizung die rhythmischen Kontraktionen des Froschmagenringes

1) Mit dieser Erfahrung stimmen gleichfalls am Froschmagen vorgenommenen Versuche von Beck überein (Zentralbl. f. Physiol. Bd. XIX, 15).

beseitigen wollte, gebrauchte ich mit vollständigem dauernden Erfolg eine Adrenalinlösung von 1 : 50000.

Curare.

Seine Wirkung bezüglich Gefäßerweiterung (Erschlaffung) ist geringer als die des Atropins. (S. Fig. 44.) Auf den Antagonismus



Fig. 44. Subel. 6 h p. m. 6,2 g Sp. C = Curare 1 : 2000.

dieser Gifte mit Adrenalin werde ich bei der Besprechung des Angriffspunktes des Adrenalins zurückkommen.

Cocain.

Auch für dies Alkaloid ist eine gefäßerweiternde Wirkung nachzuweisen. Cocainum hydrochloricum 1 : 100 wirkt in etwa gleichem Grade erschlaffend wie Atropin 1 : 1000. Cocain 1 : 1000 erschlafft den Gefäßstreifen nicht merklich. Brodie und Dixon berichten, daß bei den erwähnten Durchströmungsversuchen erst eine 1 bzw. 5proz. Cocainlösung erweiternd auf die Gefäße wirkt. Ergebnisse von Versuchen mit Cocainadrenalinlösungen, die auch praktisch-medizinisches Interesse haben, werden gelegentlich an anderer Stelle veröffentlicht werden.

Leitungswasser.

In Quellwasser (aus der städtischen Wasserleitung) wird die Empfindlichkeit der Präparate für Reizungen rasch geschädigt und aufgehoben. Hierbei erlischt die für Adrenalin früher als die für elektrische Reize. (Fig. 45.)

Kaliumchlorid.

Die glatte Muskulatur ist für die Giftwirkung des Kaliumchlorids weniger empfindlich als die quergestreifte. Zum Beispiel sind 48—72 Stunden in 0,5‰ KCl Lösung gehaltene Präparate selbst noch durch Adrenalin erregbar. In einem Fall war die Erregbarkeit des Präparates auch nach fünftägigem Verweilen

in 0,5‰ KCl für Adrenalin nicht erloschen. Bei den Nerven quergestreifter Muskeln wäre eine tödliche Vergiftung zweifellos (vgl. Overton, Pflügers Archiv 105). In einer 0,5proz. Lösung ist nach 8 Stunden die Empfindlichkeit für Adrenalin nicht mehr vorhanden, die für elektrischen Reiz noch ganz deutlich, wobei es gelingt, eine weitere Zuckung zu superponieren. (Fig. 46.)




Fig. 45. Subcl. 1 h in Leitungswasser von 36°. 6,2 g Sp. Adrenalin unwirksam.

*) Absinken des Hebels bei Trommelstillstand von 1 1/2 h. Öffnungsschläge darnach unwirksam.




Fig. 46. Subcl. 8 1/4 h in 0,5proz. Kaliumchloridlösung. 12,4 g Sp.




Fig. 47. Subcl. 10 h p. m. 6,2 g Sp. BaCl₂ = Zugabe von 0,4 BaCl₂ zu 20 cem Ringerlös.

Bariumchlorid.

Um erheblichere Kontraktionen auszulösen, bedurfte es an unserem Präparat einer ziemlich hohen Konzentration, 0,5—2‰. Am Froschmagenring war eine 3—6fach niedrigere Konzentration imstande noch kräftigere Kontraktionen zu bewirken. An der Kontraktion des Gefäßstreifens ist der eigentümliche treppenförmige Anstieg der Kurve bemerkenswert.

Angriffspunkt des Adrenalins.

Nur von wenigen Autoren wurde anfänglich die Meinung vertreten, daß das Adrenalin zentral wirke, so von Szymonowicz und Cybulski, sowie auch von Tigerstedt. Die vorzüglich periphere Wirkung des Giftes ist jetzt außer Frage. Fraglich ist nur, ob es an den glatten Muskelfasern oder an den Nervenendapparaten angreift. Bo-



Fig. 48. Frostmagenband.
4 g Sp. Bariumchlorid 1 : 300.

ruttau hält in einer früheren Arbeit (Pflügers Arch. Bd. 78, 1899) die Wirkung des Nebennierenextraktes auf die Gefäßmuskulatur für wahrscheinlich; für die andersartige Wirkung auf den Darm nimmt er an, daß das Gift an nervösen Organen angreift, da »auf zwei anatomisch und funktionell sonst durchaus gleichartige Gewebe« eine entgegengesetzte Wirkung schwer erklärbar sei. Langlois läßt die Frage offen, Langley neigt mehr zur Annahme muskulärer Wirkung. Nach Brodie und Dixon wirkt das Adrenalin auf die Gefäßsnerven. Ihre Be-

weise gründen sich hauptsächlich darauf, daß gewisse Nervengifte, Apocodein, Cocain etc. antagonistisch wirken, daß ferner das Adrenalin an den Lungengefäßen unwirksam sei. Über den letztern Punkt vergleiche man das über die Versuche an Lungengefäßen Gesagte (S. 32). 24 Stunden nach Tötung des Tieres fanden Brodie und Dixon noch eine Kontraktion der (Extremitäten)-Blutgefäße auf Bariumchlorid, auf Adrenalin aber nicht mehr. Bei geeigneter Konservierung und Methode bleibt, wie oben gezeigt, das Adrenalin wesentlich länger nach der Tötung an den Gefäßen wirksam, nach 24 Stunden ist seine Wirksamkeit noch unvermindert.

Läwen kommt auf Grund von Versuchen mit Curarin-Suprarenin zu der Ansicht, daß die glatten Muskelfasern den Angriffspunkt des Adrenalins bilden.

Diese aus der Literatur herausgegriffenen Beispiele von Ansichten — von einer theoretischen Diskussion der Experimente muß ich absehen und werde nur noch auf die Lävinschen Versuche etwas eingehen — ergeben, daß über die interessante Frage die Ansichten der Autoren bis in die neueste Zeit geteilt sind. Nach den neueren literarisch-kritischen Besprechungen (Möller etc. s. S. 4) ist die Frage noch nicht definitiv beantwortet. Nach eigenen Versuchen wurden folgende Erfahrungen gewonnen:

I. Eine Anzahl Versuche mit antagonistisch wirkenden Nervin, hauptsächlich Atropin, wurden ausgeführt, wobei sich ein deutlicher Antagonismus nachweisen läßt, was allerdings mit Vorsicht gedeutet werden muß, so lange der Angriffspunkt




Fig. 49. Subel. $2\frac{1}{2}$ h p. m. 6,2 g Sp. Z. $ad + at = 0,3$ Adrenalin und 1,5 Atropin.
Adrenalin = 1 : 50 000, Atropin = 1 : 1000.

der antagonistisch wirkenden Substanz nicht genau bekannt ist. In schwächerem Grade als Atropin wirken Cocain und Curare antagonistisch.

Gegen die Lävinsche Beweisführung, daß Adrenalin ein Muskelgift sei, sind Einwände zu machen. Er folgert: »Wenn ein curarisierter Frosch noch Suprareninwirkung zeigt, so ist das ein Beweis a fortiori, daß Suprarenin keine Nervenwirkung haben kann.« Diese Voraussetzung, daß Suprarenin das schwächere Gift sei, ist ja gerade im Hinblick auf die auch von Läven nachgewiesene außerordentliche Toxizität des Adrenalins (Suprarenins) unwahrscheinlich. Tillie, den Läven zitiert, sagt a. a. O. übrigens nur: »Man wird wohl mit Sicherheit annehmen, daß das Curarin, wenn auch in viel schwächerem Grade doch

in derselben Weise auf die äußerste Peripherie der Gefäßsnerven wie auf diejenige der motorischen Nerven einwirkt.« Dagegen äußert Grützner: »Lähmend (auf die glatten Muskeln nämlich) wirken Atropin, Nikotin, Cocain. Curare dagegen ist namentlich im Verhältnis zu seiner Wirkung auf die motorischen Nervenendigungen quergestreifter Muskeln wirkungslos oder nahezu wirkungslos.« Eucain- und Tropicocainlösungen (1 : 1000) vermindern nach Lāwens Versuchen die Suprareninwirkung, was, wenn er sich auf die antagonistische Wirkung beziehentlich Nichtwirkung des Curarins allein stützen will, einen Widerspruch bedeutet.

II. Außer dem deutlichen Antagonismus des Atropins und anderer Alkaloide, worauf doch immerhin ein gewisser Wert zu legen ist, glaube ich noch andere Beweise für die Nervenendwirkung des Adrenalins anführen zu können. In ziemlichem Maße wahrscheinlich ist sie schon durch die Wirksamkeit so niedriger Konzentrationen, da von den beiden als Angriffspunkt in Frage kommenden Gebilden die Nerven an Masse weit hinter den Muskeln zurückstehen.

III. Die Adrenalinwirkung nimmt von Tag zu Tag ab (s. S. 16) und ist erloschen, während die Empfindlichkeit für muskuläre, elektrische Reizung noch sehr gut erhalten ist. Ein solches Verhalten ist wohl so zu verstehen, daß, ganz in Analogie zu einer




Fig. 50. Subclaviastreifen 6 $\frac{1}{2}$ d p. m., am 1. u. 3. Tag mit Erfolg durch Adrenalin gereizt.

Erscheinung des Absterbens beim quergestreiften Muskel, die früher absterbenden Nerven den Angriffspunkt des Adrenalins bilden. Ich verweise auf die Kurven in Fig. 17 und gebe noch eine zweite derartige Kurve wieder. Die Präparate in der Fig. 17 sind nur zu je einem Versuch benutzt; der zu dem Versuche in Fig. 50 dienende Gefäßstreifen war am ersten und dritten

Tage nach der Schlachtung des Tieres mit Adrenalin in der gewöhnlichen Weise und mit zu erwartendem Erfolg (Zuckungshöhe am 1. Tag 19 mm, am 3. Tag 4 mm) gereizt worden. In Ringerlösung, bei niederer Temperatur bewahrt, ist der nämliche Streifen am sechsten Tage elektrisch gut, durch Adrenalin nicht reizbar.

IV. Im Sinne einer Nervenwirkung ist es auch zu deuten, daß Adrenalin nur innerhalb eines gewissen Temperaturbereiches wirksam ist. Für einen anderen sympathischen Nerven, den *Accelerans cordis*, hat Baxt (zitiert noch v. Frey, Sitzungsber. der Physikal.-Medizin. Ges. Würzburg 1905) eine ähnliche Abhängigkeit von der Temperatur nachgewiesen.

V. Die Kaliumchloridvergiftung beginnt nach den Untersuchungen Overtons früher an den Nerven als an den Muskeln der quergestreiften Muskulatur. Ein mit KCl vergifteter Gefäßstreifen wird für Adrenalin früher unempfindlich als für elektrischen Reiz (s. S. 36).

VI. Adrenalin wirkt auf das Gefäßsystem erregend, am Darmtrakt lähmend. Wie oben gesagt, kommt dem auf bestimmte Weise gewonnenen Extrakt aus den die gesamte Nebennieren-substanz enthaltenden Tabloids eine eigentümliche Darm-(Magen)-reizende Wirkung zu. Man mußte nun umgekehrt erwarten, daß dieses Extrakt, wenn es einen konträr wirkenden Stoff zu dem aus dem gleichen Organ gewonnenen Nervengift Adrenalin enthielt, nicht erregend, sondern lähmend auf die Gefäße einwirkt, was sich auch bestätigte (s. S. 22). Auch hierin darf man einen gewissen Beweis für die Nervenendwirkung erblicken.

VII. Es kann noch als Beweis gelten, daß an älteren Präparaten Atropin gleich Adrenalin unwirksam wird.

VIII. Ein neuerdings von Magnus angegebener Beweis für die Nervenwirkung erscheint mir sehr erwähnenswert und einleuchtend. Die Sistierung der spontanen Darmkontraktionen am ausgeschnittenen, überlebenden Präparat erfolgt nach Trennung der den Auerbachschen Nervenplexus enthaltenden Darmschicht, welche Methode eben Magnus eingeführt hat. Der Schluss, daß das gleichfalls die Kontraktionen aufhebende Adrenalin an

diesem Nervenplexus angreift, liegt sehr nahe. Wenn nun auch noch die restierende Schicht mit Adrenalin (Suprarenin) vergiftet wird, so bleibt sie doch muskulär (z. B. mechanisch) gut reizbar.

Neben den bisher vorgebrachten Fragen habe ich auch noch einige andere, für die Methode interessierende untersucht. Eine Anzahl Untersuchungen wurden ausgeführt: I. über das Verhalten der Präparate in isotonischer, bzw. hypotonischer Ringerlösung, sowie II. über die Frage der Sauerstoffzufuhr.

I.

Verglichen wurde das Verhalten der Präparate in drei Ringerlösungen von nachstehender Zusammensetzung:

a)	b)	c)
9‰ NaCl	8,5‰ NaCl	6,5‰ NaCl
0,2‰ KCl	0,2‰ KCl	0,2‰ KCl
0,2‰ CaCl ₂	0,2‰ CaCl ₂	0,2‰ CaCl ₂

Zur Reizung wurden Zwillingspräparate verwendet und sowohl elektrisch als chemisch (Adrenalin) gereizt. Es ergeben sich hierbei an frischen Präparaten in den Reizeffekten keine wesentlichen Unterschiede. Dagegen fand ich in drei Versuchen, daß in hypotonischer (!) Ringerlösung, 6,5 NaCl‰, längere Zeit bewahrte Präparate für elektrischen Reiz als auch für Adrenalinreizung etwas besser und länger als in isotonischer empfindlich blieben.

II.

Der Sauerstoff wurde aus einem Gasometer entnommen und vom Boden des Versuchsgläschens aus durch die Ringerlösung hindurchgeleitet. Bei den Präparaten, die Sauerstoffzufuhr erhielten, hätte man einen flotteren Ablauf der Zuckungskurve und vielleicht eine kräftigere Kontraktion voraussetzen können. Indes ergab eine große Versuchsreihe von elektrischen Reizungen an Zwillingspräparaten in dieser Beziehung keinen deutlichen Unterschied zugunsten der Sauerstoffzufuhr. Jedoch bei länger im Gang erhaltenen Versuchen, besonders bei höherer (Körper-) Temperatur und mehreren Reizungen am gleichen Präparat, zeigte

sich, daß das mit Sauerstoff gespeiste etwas länger und besser elektrisch erregbar bleibt. (Fig. 51, 52.)




Fig. 51. Subel. 11 h in Ringerlösung von 37°. Z., 51,4 g Sp. Oberes Präparat erhielt ständige O₂-Zufuhr, unteres gar keine. 5. elektr. Reizung.




Fig. 52. Dieselben Gefäßstreifen wie in Fig. 51. 12 h in Ringer von 37°. 6. Reizung.




Fig. 53. Subel. 51,4 g Sp. 5½ h in Ringer von 37°. Sauerstoffzufuhr. Zuckung auf Öffnungsschlag mit Suppersition einer 2. Zuckung. 3. Ö = 3 Öffnungsschläge hintereinander.




Fig. 54. Subel. 8½ h p. m. 51,4 g Sp. Bei der ersten Marke wird die Sauerstoffzufuhr begonnen, bei der zweiten abgestellt. 1 Minute = 2 mm.

Der Ablauf der Zuckung auf Öffnungsschlag ist bei frischen Zwillingspräparaten zeitlich annähernd gleich. Offenbar verhindert die tonisierende Wirkung des Sauerstoffs das etwa zu erwartende raschere Absinken der Kurve. Die Tonussteigerung durch den Sauerstoff wurde in einer Reihe von Versuchen beobachtet. Vgl. die Kurve in Fig. 54. Auch Mac William hat gefunden, daß der Sauerstoff auf die ausgeschnittenen Gefäße kontrahierend wirkt.

Eine Reizung von Zwillingspräparaten mit hoher Adrenalin-konzentration bei hoher Spannung, wobei die Reizlösung im Gläschen verbleibt, ergibt konstant eine größere Kurvenhöhe für das Präparat mit Sauerstoffzufuhr. (Fig. 55, 56).




Fig. 55. Subel. 8 h p. m. 51,4 g Sp. Z. Reizung mit Adrenalin $2 \cdot 10^{-5}$. Oberes Präparat erhält ständige Sauerstoffzufuhr.




Fig. 56. Subel. 10 h p. m. 14,2 g Sp. Z. Reizung mit 1:1000 verdünntem Nebennierenpresssaft. Oberes Präparat erhält ständige Sauerstoffzufuhr.

Bei Reizungen mit geringen Adrenalindosen und -konzentrationen wurde ein Unterschied zugunsten der Sauerstoffzufuhr nicht konstant beobachtet.

Entfernt man die nicht mit Sauerstoff durchleitete Ringerlösung aus dem Versuchsgläschen und gibt mit Luft stark durchgeschüttelte Ringerlösung (30°) hinzu, so zieht sich das Präparat, wie in der Kurve in Fig. 57 zum Ausdruck

kommt, für kurze Zeit zusammen. Bei Zugabe einer nicht mit Luft durchgeschüttelten Ringerlösung von 30° wird eine derartige Kontraktion nicht beobachtet. Man muß daran denken, daß diese Erscheinung durch den Luftsauerstoff verursacht wird.

Wird einem mit Adrenalin gereizten Präparate (hohe Spannung) dauernd Sauerstoff zugeführt, so gelangt die Kontraktionskurve, wenn die Reizlösung alsbald nach der Reizung




Fig. 57. Subcl. 50 h p. m. 6,2 g Sp. G = Zugabe der mit Luft durchgeschüttelten Ringerlösung.

entfernt wird, nicht sehr viel, aber doch deutlich rascher zur Abszisse, was mit der rascheren Zerstörung des Adrenalins zusammenhängen wird.

Offenbar haben die Gefäßpräparate kein großes Sauerstoffbedürfnis; nach Versuchen von Magnus erstickten ausgeschnittene, überlebende Darmstücke von Warmblütern in körperwarmer Ringerlösung ohne Sauerstoffzufuhr nach zwei Stunden. Bei Sauerstoffzufuhr wurden sie sieben Stunden reaktionsfähig erhalten. Unter beiden Bedingungen reagieren die Gefäßstreifen die doppelte Zeit und länger auf den elektrischen Reiz.

Nach diesen Erfahrungen wurde in dem letzten Teil der Versuche der Sauerstoff meistens nicht ständig, sondern nur zeitweise, entweder für einige Minuten im langsamen Strom — 30 bis 60 Bläschen pro Minute — oder in einem kurzen, kräftigen Aufwallen während der Dehnung durch die Ringerlösung im Versuchszylinder geleitet. Wurde ein Präparat zu mehreren Reizungen benutzt, so wurde die Sauerstoffzuleitung von Zeit zu Zeit wiederholt. So war einerseits die Erhaltung der wenig sauerstoffbedürftigen Präparate genügend garantiert, anderseits wurde einer störenden tonischen Wirkung des Sauerstoffs vorgebeugt.

III. Bemerkung über die »Totenstarre« und den »Tonus« der glatten Muskulatur.

Nach Beobachtungen von Kühne, zitiert nach Meirowski, speziell nach Untersuchungen des letzteren, soll die Totenstarre

der glatten Muskulatur zehn Minuten bis längstens sieben Stunden nach dem Tode eintreten. Hiernach hätte man in den nach unserer Versuchsanordnung gemachten Versuchen gewisse Störungen oder Unterschiede finden müssen; dies war aber niemals der Fall. Das was Meirowski als Totenstarre bezeichnet, ist meines Dafürhaltens eine durch die Reizung bei der Präparation, die Abkühlung und die Wirkung des Luftsauerstoffs hinlänglich erklärte Zusammenziehung des Präparates, ein verstärkter

Tonus.

Diese hervorstechende Eigenschaft der glatten Muskulatur ist allerdings leicht eine Quelle für Störungen der Versuche. Die Beseitigung des Verkürzungszustandes erwies sich als durchaus notwendig. Eine Anzahl Versuche mit Atropin und Kohlensäure führten nicht zu dem gewünschten Resultat. Die Giftwirkung hätte, auch selbst bei genügender Tonusbeseitigung, an sich die Versuche beeinträchtigt. Grützner schlägt hierfür vor: »dafs man diesen Tonus durch verschiedene Mittel herabsetzen kann, habe ich schon erwähnt. Erhöhung der Temperatur wirkt vielfach in diesem Sinn. Desgleichen verschiedene Gifte (Morphin nach Morgen, Atropin nach Schulz, Cocain nach Bottazzi), schliesslich am einfachsten wohl Ruhe. Das längere Liegenlassen des Präparates oder der Organe, aus welchen man das Präparat herstellt (im Kühlen, natürlich vor Schädlichkeiten wie Vertrocknung usw. geschützt) wirkt wohl am sichersten und einfachsten.« Abgesehen von der Fraglichkeit des Erfolges bei unserem Präparat — unter dem Einflufs der Abkühlung kontrahiert es sich ja zunächst noch mehr — würde man nach dem Vorschlag von Grützner nicht zur Untersuchung genügend frischer Präparate gelangen. Für Untersuchungen von Nervengiften wäre das ein besonderer Nachteil, da man zunächst nicht weifs, wie lang diese rascher absterbenden Organe, speziell beim Warmblüter, funktionstüchtig bleiben.

Die eingangs erwähnte Dehnung erscheint also am zweckmässigsten. Sie beseitigt den Tonus in kurzer Zeit und läfst auch beim Absterben des Präparates keine Verkürzung aufkommen, wie die Kurven in Fig. 45 und Fig. 58 dartun. Der

Tonus des herausgeschnittenen Präparates ist unter sonst gleichen Umständen von erheblich verschiedener Stärke. Wurde nämlich, wie in einem Teil früherer Versuche, mit einer geringeren Belastung, 50 g, gedehnt, so reagierten eine Anzahl Präparate auf Adrenalinreizung mit kräftigen Kontraktionen, eine Anzahl sehr




Fig. 58. Karotis, 7 h p. m. *) Trommelstillstand. Absinken des Schreibhebels in 18 h. (Tod des Präparates.)




Fig. 59. Subcl. 8 h p. m. Z. Adrenalin (0,16 mg) 1 : 40 000. Präparat der Kurve a vorher »gedehnt«, das der Kurve b nicht gedehnt.

wenig oder gar nicht. Als die Dehnungsbelastung 85 g betrug, kam ein Versagen am frischen Präparat nicht mehr vor.

Der auffällige Unterschied in den Kurven der Zwillingspräparate in Fig. 59 ist auf die Dauerverkürzung (Tonus), bzw. deren Beseitigung zu beziehen.

Zusammenfassung der wichtigsten Versuchsergebnisse.

1. Die größeren Gefäße des Säugetieres bilden ein Präparat, an dem sich eine ganze Reihe Untersuchungen über glatte Muskelfasern mit Vorteil ausführen lassen, weil sie außerordentlich lebenszäh sind, und weil die Reizungsergebnisse nicht durch spontane Kontraktionen gestört werden.

2. Die in der Wärme eintretende Erschlaffung wird bei rascher Erwärmung durch eine kurze Erregungsphase eingeleitet.
3. Durch Induktionsschläge können kräftige und langdauernde Zuckungen des Streifens bewirkt werden. Er bleibt bis zu 13 Tagen nach Entnahme des Gefäßes aus dem Tier erregbar.
4. Die Wirkung des elektrischen Reizes wird durch niedrige Temperatur nicht aufgehoben.
5. Der Sauerstoff erhöht den Tonus der Gefäßswand.
6. Adrenalin wirkt alkaloidähnlich, es wird spezifisch gebunden, es ist auswaschbar, es wird vom Gewebe zerstört.
7. Die Schwellenreizkonzentration des Adrenalins wurde zu $1 \cdot 10^{-9}$ gefunden (0,000015 mg auf 15 ccm Ringerlösung bzw. 0,00006 mg auf 1 g Gefäßs).
8. Adrenalin wirkt wahrscheinlich auf die Nervenendigungen.
9. Adrenalin wirkt bei niedriger Temperatur nicht auf die Gefäßstreifen des Warmblüters.
10. Die Suprareninwirkung läßt sich durch die vorliegende physiologische Wertbestimmung als identisch mit der des Adrenalins nachweisen.
11. Eine adrenalinähnliche Substanz findet sich im Blute.
12. Die Lungenarterien werden durch Adrenalin kontrahiert.
13. Es finden sich Hinweise auf die Anwesenheit eines dem Adrenalin konträr wirkenden Stoffes in der Nebenniere.
14. Atropin, Cocain, Curare wirken in verschiedenem Grade gefäßerweiternd und dem Adrenalin antagonistisch.

Zum Schluß erfülle ich die angenehme Pflicht, meinem verehrten Lehrer und Chef, Herrn Prof. v. Frey, auch an dieser Stelle für sein stetes Interesse an dieser Arbeit meinen ergebensten Dank auszusprechen, der auch den beiden Assistenten des Instituts, den HH. Privatdozenten Dr. Gürber und Dr. Overton, gebührt.

Literaturverzeichnis.

* = die betreffende Arbeit lag im Referat vor.

- Battelli, Compt. rend. Soc. de Biol. Paris 1902.
Biedermann, Pflügers Archiv 1904, Bd. 102.
Bornuttan, Pflügers Archiv 1899, Bd. 78.
— Nagels Handb. d. Physiol. d. Menschen Bd. 2, 1. Hälfte.
*Bottazzi, Azione dell'adrenal. sul tessuto. Acad. medica Genova 1903, XVIII, 2.
Brodie u. Dixon, Journ. of Physiol. 1904, XXX, 5, 6.
Ellenberger, Vergleichende Anatomie der Haustiere.
Elliot, Journ. of Physiol. 1904, XXXI.
Embden u. v. Fürth, Zentralbl. f. Physiol. 1904, Bd. 18, 2.
Ehrmann, Arch. f. exp. Pathol. u. Pharm., Bd. 53, 1 u. 2.
v. Frey, Sitzungsber. d. Physik-med. Gesellsch. Würzburg 1905.
v. Fürth, Biochem. Zentralblatt 1903, Bd. 2, 1.
Goldschmitt, Materialien zu einer Monographie über die Nebennieren. Inaug.-Diss. Halle 1904.
Grützner, Die glatte Muskulatur in »Ergebnisse der gesamten Physiologie« 1904, Bd. 2.
Gürber, Zur Kenntnis der wirksamen Substanz der Nebenniere. Zentralbl. f. Physiol. 1898.
Kurdinowski, Zentralbl. f. Physiol. 1904, Heft 1.
Langley, Journ. of Physiol. 1902.
Langlois, Les capsules surrénales. Paris 1904.
Läwen, Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1904, Bd. 51, 4—6.
Mac William, Proceedings Royal Society 1902.
Magnus, Pflügers Archiv 1904, Bd. 102 und 1905, Bd. 108.
Metzger, Zur Kenntnis der wirksamen Substanzen der Nebennieren. Inaug.-Diss. Würzburg 1897.
Meirowski, Pflügers Archiv 1899, Bd. 78.
Morgen, Reizbarkeit u. Starre der glatten Muskeln. Inaug.-Diss. Halle 1888.
Nägeli, Oligo-dynamische Erscheinungen.
Oliver u. Schäfer, Journ. of Physiol. 1894, 1895.
Overton, Pflügers Archiv 1905, Bd. 105.
Pfeffer, Untersuchungen aus dem Botanischen Institut Tübingen.
Schmiedeberg, Grundriss der Pharmakologie 1902.
Schulz, Engelmanns Archiv 1903, Suppl.
Straub, Arch. di Fisiol. 1903, Bd. 1, H. 1.
Swale Vincent, Die Natur des Suprarenalkörpers des Aales. Journ. of Physiol. XLVIII—XLIX.
*Tigerstedt, Skand. Archiv f. Physiol.
Tillie, Archiv f. exp. Pathol. u. Pharm. 1890, Bd. 47.
Weifs u. Harris, Pflügers Archiv 1904.

Lebenslauf.

Ich, Oskar Meyer, bayerischer Staatsangehörigkeit, bin geboren am 8. März 1880 zu Würzburg als Sohn des Kaufmanns S. Meyer. Nach Besuch des Neuen Gymnasiums in Würzburg erhielt ich im Juli 1900 das Reifezeugnis. Im Herbst 1900 bezog ich die Universität Würzburg, woselbst ich im Sommer 1902 die ärztliche Vorprüfung bestand. Im Wintersemester 1903/04 studierte ich in Berlin und kehrte dann nach Würzburg zurück.

Die ärztliche Staatsprüfung begann ich am 10. Mai 1905 und beendete sie am 22. Nov. 1905. Vorstehende Dissertation verfaßte ich unter Leitung des Herrn Prof. v. Frey.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100